

# 6~7月 ご推進品目と 管理のポイント

活水剤：プライマー604・アクアダクト  
殺虫剤：ダイボスチオン・エキソジノン・  
ダイアジノンSLソル  
栄養剤：グリーンメカ・メカプラス・  
マリンパワー  
誘引剤：ユーイン・エリスコトラップ

6月 梅雨入りとなります。日照不足が続きます。N肥は控え、キレート鉄施肥は有効です。  
7月 梅雨明けは赤焼け(ピシウム)の発生を受けるので注意！！

## <ベント>

### 病 気

・マット化がすすむと 6月 ダラースポット 7月 葉腐病(ブラウンパッチ)の発生あります。  
..... キャッチドー 又は ロブドー 2 g / m<sup>2</sup> 1 ℓ / m<sup>2</sup> 散布

## <コーライ>

・犬の足跡..... ロブドー 2 g / m<sup>2</sup> 1 ℓ / m<sup>2</sup> 散布

### 害 虫


・コガネ成虫・シバオサゾウムシ成虫.....ダイボスチオン 1000 倍  
\*シバオサゾウムシ成虫の場合 0.5 ℓ / m<sup>2</sup> 散布 でお願ひします。  
・6月中旬 シバツトガの防除適期..... エキソジノン 1000 倍  
・コガネ幼虫.....コアリング作業後にダイアジノン SL ソル 3 ~ 4 ml / m<sup>2</sup> 水 1 ℓ 散布

### 活 水 剤

・ドライスポットの予防と水管理資材.....プライマー604 2 ml / m<sup>2</sup> 毎月 1 回  
・ドライ発生ベントグリーン .....アクアダクト 2.5 ml / m<sup>2</sup> 水 1 ℓ 散布  
\* 散布後は 2 ~ 3 日十分に灌水を実施下さい。

## ミニ情報

### シバツトガとスジキリヨトウの食害について



茎を残して芯芽も食いつくすので  
回復は不可  
芝の張替を行わなければなりません。


芯芽だけ残します。

## <糖の補給>

グリーンメカ・メカプラス 5 ml / m<sup>2</sup>

## <アミノ酸補給>

マリンパワー 2 ~ 4 ml / m<sup>2</sup>



\* ご推進品目は土曜日  
(PM 2 : 00 迄)でも  
出荷致しますのでご  
用命下さい