

6~7月 ご推進品目及び管理ポイント

暦では、6/11(月)が「入梅」です。連日の雨続きのため^{グリーン}芝生は日照不足と軟弱徒長になります。病害虫の発生も多く管理に最も注意するシーズンです。又、7月中・下旬の梅雨明け時は赤焼け(ピシウム)が発生しやすく、サッチの除去とコアリング作業は重要です。ドライスポット対策を心掛けましょう。



べんとう

病害	葉腐れ病(ブラウンパッチ) ダラスポット ピシウムブライト	予防剤	キャッチドール グリーンオキシラン	} 2g/m ² 0.5~1L 散布
		予防と治療	ロブドール	
ドライスポット	プライマー604	2ml/m ²	0.5~1L 散布	
ドライ発生後	アクアダクト	2.5ml/m ²	1L 散布(直後の手散水又は夕方十分散水下さい)	

コーライ

「黄化現象」...石灰や肥料を施すと一層激化させますので注意

ヘルミント葉枯れ病(犬の足跡)

予防剤	グリーンオキシラン	2g/m ²	0.5~1L 散布	予防・治療	ロブドール	2g/m ²	0.5~1L 散布
フェアリーリング	ロブドール	3~4g/m ²	+ AG L500 倍			1L/m ²	散布
*処理前に一度、コアリング作業又はフォーキング作業を実施し、 アクアグロ-シーズ 10g/m ² 施用が有効です							
黄化現象	コ・エンザ	2~3g/m ²	1L 散布	(注)バケツなどで中間液を作りタンクに投入下さい			

芝害虫

シバツトガ幼虫 (6月中~下旬)	エキソジノン	1,000 倍	0.5~1L 散布
*FW散布の場合 660 倍液(1,000L、3本) 200~300ml/m ² 散布下さい			
タマナガヤ スジキリヨトウ コガネムシ(成虫) シバオサゾウムシ成虫	(6~7月) ダイボスチオン	1,000~1,500 倍	} 0.3~1L/m ² 散布
	ショットガン	1,000 倍	
コガネムシ幼虫 (6~7月)	ダイアジノンSLゾル	3~4ml/m ²	1L/m ²
*コアリング後処理が有効です。			



池の防藻と着色に

ニトトップKT	2ppm	} 中間液を作り 池に注入下さい (袋のまま投入式)
ワーラーブルー	水量 100t に 22g(1袋)	

マメコガネ成虫 誘引剤・トラップ

アシナガコガネ用もあります。

ユーイン...トラップに2本設置(25g×18)カートン入り @1,300円
トラップ...エリスコトラップ(9コ入) @3,700円

ミミズ糞塚防止

みみんず水和剤 2g/m² 1~2L 散布
アクアグロ-L加用はより有効です

栄養剤

日照不足・軟弱徒長防止		
グリーンメカ	メカプラス	5~10ml/m ²
マリンパワー(アミノ酸補給)		2~4ml/m ²
メカエース(ダメージの早期回復)		5~10ml/m ²

ミニ知識



適度な糖は光合成を促進する!!
1mgの糖の供給によって、光合成による炭水化物(デンプン)の生成を3mg増加させることができる。

プライマー-604

日本での研究開始7周年

プラナナキャンペーン 好評 実施中!!

ゴルフ場様
購入累計5c/sで1c/s添付
(8月末迄)